

Приложение Б. Алгоритмы действий врача

Первичная и уточняющая диагностика рака мочевого пузыря




Рисунок 1. Схема первичной диагностики рака мочевого пузыря



Рисунок 2. Схема уточняющей диагностики рака мочевого пузыря

Самостоятельная системная терапия

Таблица №7: Первая линия системной противоопухолевой терапии

Группа	Режим предпочтения	Альтернативный режим
Нет противопоказаний к цисплатину ¹	GC MVAC ddMVAC	GC+атезолизумаб
Есть противопоказания к цисплатину, нет противопоказаний к карбоплатину ² , PD-L-	GarboGem	GarboGem +атезолизумаб
Есть противопоказания к цисплатину, нет противопоказаний к карбоплатину ² , PD-L+	GarboGem Атезолизумаб* #Пембролизумаб**	GarboGem +атезолизумаб
Есть противопоказания к препаратам платины	Доцетаксел Паклитаксел Гемцитабин	Атезолизумаб * #Пембролизумаб**
При контроле над опухолью после 4-6 циклов ХТ, основанной на препарате платины	Авелумаб	

¹ ECOG PS > 1; СКФ ≤ 60 мл/мин/1,73 м²; снижение слуха ≥ 2 степени; периферическая нейропатия ≥ 2 степени; СН класса III NYHA.

² Критерии РКИ EORTC 30986 (PSECOG > 2; СКФ < 30 мл/мин/1,73 м²; ECOG PS 2 и СКФ < 60 мл/мин/1,73 м²).

*Для атезолизумаба положительной является экспрессия ≥ 5% (Ventana PD-L1 (SP142) Assay® (Ventana Medical Systems, Inc.))

**Для пембролизумаба положительной является экспрессия ≥ 10% (тест-система Dako PD-L1 IHC 22C3 PharmDx Assay (Dako North America, Inc.))

Группа	Режим предпочтения	Альтернативный режим
Нет противопоказаний к цисплатину ¹	GC MVAC	GC + #атезолизумаб**

	ddMVAC	
Есть противопоказания к цисплатину, нет противопоказаний к карбоплатину ² , PD-L-	GarboGem	GarboGem + #атезолизумаб**
Есть противопоказания к цисплатину, нет противопоказаний к карбоплатину ² , PD-L+	GarboGem Атезолизумаб** ³ Пембролизумаб** ⁴	GarboGem + #атезолизумаб**
Есть противопоказания к препаратам платины	#Доцетаксел** #Паклитаксел** #Гемцитабин**	Атезолизумаб** Пембролизумаб**
При контроле над опухолью после 4-6 циклов ХТ, основанной на препарате платины	Авелумаб**	

¹ ECOGPS > 1; СКФ ≤ 60 мл/мин/1,73 м²; снижение слуха ≥ 2 степени; периферическая нейропатия ≥ 2 степени; СН класса III NYHA.

² Критерии РКИ EORTC 30986 (PSECOG > 2; СКФ < 30 мл/мин/1,73 м²; ECOGPS 2 и СКФ < 60 мл/мин/1,73 м²).

³ Для атезолизумаба положительной является экспрессия ≥ 5% (Ventana PD-L1 (SP142) Assay® (Ventana Medical Systems, Inc.))

⁴ Для пембролизумаба положительной является экспрессия ≥ 10% (тест-система Dako PD-L1 IHC 22C3 PharmDx Assay (Dako North America, Inc.))

Таблица №8: Вторая линия системной противоопухолевой терапии

Лечение 1 линии	Режим предпочтения	Альтернативный режим
Химиотерапия, основанная на препаратах платины	Пембролизумаб**	Атезолизумаб** Ниволумаб** Винфлунин #Паклитаксел** #Доцетаксел**
Химиотерапия, основанная не на препаратах платины	Атезолизумаб**	Винфлунин
Иммунотерапия ингибиторами иммунных контрольных точек	Режимы химиотерапии, не использованные ранее или использованные за 12 и более месяцев до прогрессирования, с достигнутым эффектом или стабилизацией	