

Клиническая классификация бронхолитов

Клиническая классификация бронхолитов основана на этиологии, а также включает системные заболевания, при которых бронхолит развивается как один из синдромов [9]:

Бронхолиты, развившиеся вследствие вдыхания различных веществ:

- Бронхолит, развившийся вследствие вдыхания дыма
- Бронхолит, развившийся вследствие воздействия раздражающих газов и минеральной пыли
- Бронхолит, развившийся вследствие вдыхания органической пыли

Инфекционный бронхолит (вирусный)

Постинфекционный (облитерирующий) бронхолит

Бронхолит, индуцированный лекарственными средствами

Бронхолит, ассоциированный с коллагенозами

Бронхолит, ассоциированный с воспалительными заболеваниями кишечника

Посттрансплантационный бронхолит

Бронхолит, ассоциированный с паранеопластической пузырчаткой

Гиперплазия нейроэндокринных клеток с бронхиальным фиброзом

Диффузный панбронхолит

Криптогенный бронхолит

Прочие:

- Семейные формы фолликулярного бронхолита
- Бронхолит при иммунодефицитах
- Бронхолит при лизинурии
- Бронхолит при атаксии-телеангиоэктазии (синдроме Луи-Бар)
- Бронхолит при IgA нефропатии

Приложение Б. Алгоритмы действий врача



