


## Приложение Б. Алгоритмы действий врача



- \*Высокий риск определяется наличием ≥1 критерия:
- High grade
  - Инвазивная уротелиальная карцинома
  - Сопутствующая CIS
  - Рецидивная опухоль

НУЭ – нефруретерэктомиа  
 ЗЛАЭ – забрюшинная лимфаденэктомия  
 АТ – адъювантная терапия

## Самостоятельная системная терапия

Таблица №6: Первая линия системной противоопухолевой терапии

Группа	Режим предпочтения	Альтернативный режим
Нет противопоказаний к цисплатину <sup>1</sup>	GC MVAC ddMVAC	GC+атезолизумаб
Есть противопоказания к цисплатину, нет противопоказаний к карбоплатину <sup>2</sup> , PD-L-	GarboGem	GarboGem +атезолизумаб
Есть противопоказания к цисплатину, нет противопоказаний к карбоплатину <sup>2</sup> , PD-L+	GarboGem Атезолизумаб* #Пембролизумаб**	GarboGem +атезолизумаб
Есть противопоказания к препаратам платины	Доцетаксел Паклитаксел Гемцитабин	Атезолизумаб* #Пембролизумаб**
При контроле над опухолью после 4-6 циклов ХТ, основанной на препарате платины	Авелумаб	

<sup>1</sup> ECOGPS > 1; СКФ ≤ 60 мл/мин/1,73 м<sup>2</sup>; снижение слуха ≥ 2 степени; периферическая нейропатия ≥ 2 степени; СН класса III/IV.

<sup>2</sup> Критерии РКИ EORTC 30986 (PSECOG > 2; СКФ < 30 мл/мин/1,73 м<sup>2</sup>; ECOGPS 2 и СКФ < 60 мл/мин/1,73 м<sup>2</sup>).

\*Для атезолизумаба положительной является экспрессия ≥ 5% (Ventana PD-L1 (SP142) Assay® (Ventana Medical Systems, Inc.))

\*\*Для пембролизумаба положительной является экспрессия ≥ 10% (тест-система Dako PD-L1 IHC 22C3 PharmDx Assay (Dako North America, Inc.))

Группа	Режим предпочтения	Альтернативный режим
Нет противопоказаний к цисплатину <sup>1</sup>	GC MVAC ddMVAC	GC + #атезолизумаб**

Есть противопоказания к цисплатину, нет противопоказаний к карбоплатину <sup>2</sup> , PD-L-	GarboGem	GarboGem + #атезолизумаб**
Есть противопоказания к цисплатину, нет противопоказаний к карбоплатину <sup>2</sup> , PD-L+	GarboGem Атезолизумаб** <sup>3</sup> Пембролизумаб** <sup>4</sup>	GarboGem + #атезолизумаб**
Есть противопоказания к препаратам платины	#Доцетаксел** #Паклитаксел** #Гемцитабин**	Атезолизумаб** Пембролизумаб**
При контроле над опухолью после 4-6 циклов ХТ, основанной на препарате платины	Авелумаб**	-- -

<sup>1</sup> ECOGPS > 1; СКФ ≤ 60 мл/мин/1,73 м<sup>2</sup>; снижение слуха ≥ 2 степени; периферическая нейропатия ≥ 2 степени; СН класса III/IV/VA.

<sup>2</sup> Критерии РКИ EORTC 30986 (PSECOG > 2; СКФ < 30 мл/мин/1,73 м<sup>2</sup>; ECOGPS 2 и СКФ < 60 мл/мин/1,73 м<sup>2</sup>).

<sup>3</sup> Для атезолизумаба положительной является экспрессия ≥ 5% (Ventana PD-L1 (SP142) Assay® (Ventana Medical Systems, Inc.))

<sup>4</sup> Для пембролизумаба положительной является экспрессия ≥ 10% (тест-система Dako PD-L1 IHC 22C3 PharmDx Assay (Dako North America, Inc.))

**Таблица №7: Вторая линия системной противоопухолевой терапии**

Лечение 1 линии	Режим предпочтения	Альтернативный режим
Химиотерапия, основанная на препаратах платины	Пембролизумаб**	Атезолизумаб** Ниволумаб** Винфлунин #Паклитаксел** #Доцетаксел**
Химиотерапия, основанная не на препаратах платины	Атезолизумаб**	Винфлунин
Иммунотерапия ингибиторами иммунных контрольных точек	Режимы химиотерапии, не использованные ранее или использованные за 12 и более месяцев до прогрессирования, с достигнутым эффектом или стабилизацией	