

МНН	Состав	Дозировка и схема введения	Наличие в ЖНВЛП
	<p><i>Вспомогательные вещества:</i> стабилизатор - смесь 0.08 мл водного раствора ЛС-18* и 0.02 мл 10% раствора желатина; гентамицина сульфата остаточная (технологическая) примесь - не более 0.5 мкг</p>	<p>Дети до 6 лет не привитые и не имеющие сведений о прививках – однократно, далее в 6 лет с интервалом не менее 3-х мес. от первой прививки – повторно</p> <p>Дети 6 лет-17лет 11 мес. 29 дней и взрослые в соответствии с приказом МЗ РФ 1122-н от 06.12.2021, привитые однократно- вторая прививка с интервалом не менее 3-х мес. после первой, не привитые и не имеющие сведений о прививках- двукратно с интервалом не менее 3-х мес</p>	
<p>Иммуноглобулин человека нормальный ** (Immunoglobulinum humanum normale)</p> <p>Иммуноглобулин человека нормальный** (раствор для внутримышечного введения), инструкция по медицинскому применению РУ № ЛС-000373</p>	<p>Иммуноглобулин (по белку) — 0,15 г ((10 ± 0,5)%) белковой фракции плазмы крови человека, выделенной методом фракционирования этиловым спиртом при низких температурах</p> <p><i>Вспомогательные вещества</i> Глицин (кислота аминокислотная) — 0,03 г (2%) вода для инъекций — до 1,5 мл.</p>	<p>Вводят внутримышечно в верхний наружный квадрант ягодичной мышцы или наружную поверхность бедра однократно, с 3-месячного возраста, не болевшим корью и не вакцинированным, не позднее 4 суток после контакта с больным. Дозировку препарата детям (1,5 или 3,0 мл) устанавливают в зависимости от состояния здоровья и времени, прошедшего с момента контакта с больным. При контакте со смешанными инфекциями, детям препарат вводят в объеме 3,0 мл (2 дозы).</p>	<p>да</p>

Приложение Б. Алгоритмы действий врача

Пациент с подозрением на корь

