Приложение Б. Алгоритмы действий врача

Схема 1



Схема 2

ДИАГНОСТИКА
ОБСЛЕДОВАНИЕ пациентов с подозрением на ССЛ
(Стр. 16-48)
ОБСЛЕДОВАНИЕ пациентов с ССЛ с подозрением на гемофагоцитарный синдром
(Стр. 48-54)
ОБСЛЕДОВАНИЕ пациентов с подтвержденным диагнозом ССЛ в стадии активной болезни
(Стр. 54-69)
Лабораторные диагностические исследования стр. 28-35
Инструментальные диагностические исследования стр. 35-42
Иные диагностические исследования стр. 42-48
Лабораторные диагностические исследования стр.50-51
Инструментальные диагностические исследования стр.51-53
Иные диагностические исследования стр. 53-54
Лабораторные диагностические исследования стр.54-61
Инструментальные диагностические исследования стр. 61-64
Иные диагностические исследования стр. 64-69

Схема 3


ЛЕЧЕНИЕ системной средиземноморской лихорадки (ССЛ)
(проводится в стационарных условиях – Приказ МЗ РФ № 441н)
Схема 4.
Лечение ССЛ без гемофагоцитарного синдрома (стр. 69-81)
Схема 5.
Лечение гемафагоцитарного синдрома у пациентов с ССЛ (стр. 81-85)

Схема 4


4. Лечение ССЛ без гемофагоцитарного синдрома
(специализированная, в том числе высокотехнологичная помощь в стационарных условиях – Приказ МЗ РФ № 441)
Контроль эффективности проводимой терапии
(стр. 220-233)
Терапия эффективна?
НЕТ
ДА
Коррекция терапии (до достижения эффективности)
(стр. 70-81)
Лечение в стационаре
(стр. 69-81)
Контроль безопасности терапии
(стр. 89-118)
Терапия безопасна?
НЕТ
ДА
Коррекция терапии
(до достижения безопасности)
(стр. 70-81)
Диспансерное наблюдение в амбулаторных условиях
(Схема 7)

Схема 5

5. ЛЕЧЕНИЕ гемофагоцитарного синдрома у пациентов с ССЛ
(специализированная, в том числе высокотехнологичная помощь в стационарных условиях – Приказ МЗ РФ № 441)
Контроль эффективности проводимой терапии
(стр. 84-85)
Терапия эффективна?
НЕТ
ДА
Коррекция терапии до достижения эффективности
(стр. 81-84)
4. Лечение пациентов с ССЛ без гемофагоцитарного синдрома

Схема 6

Схема 7