


Первоцвета весеннего корней экстракт+Тимьяна обыкновенного травы экстракт	по 3 мерных дозы 3–4 раза в сутки
Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты	
парацетамол**	325-500 мг внутрь каждые 8 ч
ибупрофен**	200 мг 3 раза в день
Ибупрофен+Парацетамол	325/400 3 раза в день

Приложение Б. Алгоритмы действий врача



Приложение В. Информация для пациента

- Обратиться к врачу. Важно начать лечение вовремя, на основании принципов доказательной медицины.
- Домашний режим.
- Воздух в помещении должен быть достаточно прохладный и влажный. В отопительный сезон воздух нужно дополнительно увлажнять.
- Увеличить питьевой режим, в т. ч. использовать щелочную минеральную воду.

- Не принимать самостоятельно антибактериальные препараты.
- Возможно применение препаратов группы нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты (ибупрофен**) или препараты группы другие анальгетики и антипиретики (парацетамол**) или лекарственных форм, содержащих парацетамол+ибупрофен при температуре выше 38°C.
- Нецелесообразно полоскание горла, пользование горчичниками, перцовыми пластырями, банками.

Приложение Г1-ГN. Шкалы оценки, вопросники и другие оценочные инструменты состояния пациента, приведенные в клинических рекомендациях

Отсутствуют.