Приложение Б1. Алгоритм действий врача



- Наблюдение в условиях ОПНиНД
- Грудное вскармливание/кормление сцеженным грудным молоком при невозможности грудного вскармливания
- При уровне глюкозы в крови менее 2,6 ммоль/л – ввести #декстрозу** (код АТХ B05CX01) 10% раствор в дозе 2 мл/кг путем внутривенного введения лекарственных препаратов с последующим непрерывным внутривенным введением лекарственных препаратов декстрозы**(код АТХ B05CX01) 10% раствора, со скоростью 6 мг/кг в мин.
- При гипомагниемии ниже 0,6 ммоль/л – вводить растворов электролитов (код АТХ B05XA) – #магния сульфата** 20% раствора путем внутривенного введения лекарственных препаратов в дозе 0,1–0,3 мл/кг.
- При гипокальциемии ниже 1,8 ммоль/л – вводить препараты кальция (код АТХ A12AA) - #кальция глюконата** 10% раствор путем внутривенного введения лекарственных препаратов в дозе 1–2 мл/кг с последующим пероральным введением поддерживающей дозой 50–60 мг/кг/сутки
- При выявлении гипертрофической кардиомиопатии\малых врожденных пороков сердца – прием (осмотр, консультация) врача -детского кардиолога первичный с целью определения дальнейшей тактики