


Приложение Б. Алгоритмы действий врача

Алгоритм диагностики и лечения при функциональной диспепсии у детей


Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Алгоритм выбора лечебной программы исходя из диагностических возможностей, в том числе верификации *H. pylori* (у пациентов с признаками ФД и при наличии симптомов «тревоги», сохранении жалоб, несмотря на проведенную терапию при синдроме эпигастральной боли, подозрении на НР-инфекцию (наследственная отягощенность по язвенной болезни, раку желудка, рефрактерная железодефицитная анемия, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура) [78, 79]

Диагностические возможности					Решение
№	ЭГДС	Диагностические тесты (инвазивные и неинвазивные)	Патолого-анатомическое (гистологическое) исследование	Определение резистентности <i>H. pylori</i> к противомикробным препаратам системного действия	
1	+	+	+	+	Индивидуальная лечебная программа с учетом чувствительности <i>H. pylori</i>
2	+	+	+	-	Стандартная схема 1 линии с учетом региональных данных и индивидуальных особенностей ребенка
3	+	+	-	-	Стандартная схема 1 линии при наличии абсолютных показаний
4	-	+	-	-	Направление на ЭГДС
5	-	-	-	-	Направление на ЭГДС

Алгоритм диагностики при рецидивирующих болях в животе и других клинически значимых симптомах у детей по [30] с изменениями

